



© Medische fotografie Tergooiziekenhuizen

Nieuwe behandeling voor mannen met vrouwenborsten

De plastisch chirurgen in Tergooiziekenhuizen gebruiken een nieuwe techniek om onnatuurlijke borstvorming bij de man te behandelen. Zij behoren hiermee tot de voorlopers in Nederland en internationaal.

Het resultaat is mooier dan bij gangbare methoden: een plattere borst, nauwelijks zichtbare littekens en minder kans op complicaties.

Bij de behandeling van vrouwelijke borstvorming bij de man (gynaecomastie) maken de plastisch chirurgen in Hilversum gebruik van het ultrasound liposuctieapparaat (UAL). Er zijn maar enkele instellingen in Nederland die dit geavanceerde apparaat in huis hebben. Volgens plastisch chirurg dr. Werner Beekman, die al in 1997 dit apparaat naar Ziekenhuis Hilversum haalde, is met een standaard liposuctieapparaat niet hetzelfde resultaat te behalen: 'Met dit UAL-apparaat wordt niet alleen heel secuur het overtollige vet weggezogen, maar zijn ook de borstklieren gemakkelijker te verwijderen. Hierdoor treden minder nabloedingen op. Door slechts kleine snedes in de tepelhof te plaatsen, blijven ook nauwelijks littekens achter.'

PRACHTIG RESULTAAT

'De kleine snedes in de tepelhof genezen zo mooi dat je ze op den duur nauwelijks meer ziet', vult zijn collega Hans-Peter Zweep aan. 'Bij andere methoden wordt de snede soms rond de tepelhof geplaatst, waardoor ernstige littekens blijven bestaan. Dan durft zo'n man na de operatie nog steeds niet naar het strand vanwege de ontsierende littekens. De combinatie van ons speciale liposuctieapparaat, de precieze verwijdering van het klierweefsel en de kleine snedes in de tepelhof geven al na korte tijd prachtig resultaat.'

Deze resultaten zijn niet onopgemerkt gebleven: patiënten uit Amsterdam en Hoogeveen hebben zich al gemeld in Hilversum. Ook internationaal is er belangstelling. **DANIELLE ESME**, arts-assistent niet in opleiding, vertelt dat er binnenkort een artikel zal verschijnen in de "Annals of Plastic Surgery". Ook is er in januari een voordracht gehouden op een congres in Parijs. De aandoening komt meestal voor bij mannen met een overgevoeligheid van het klierweefsel voor vrouwelijk hormoon, maar kan bijvoorbeeld ook optreden bij mannen die vanwege prostaatkanker hormoontherapie hebben gekregen. Ook aangeboren afwijkingen, bepaalde tumoren en het gebruik van drugs kunnen bij mannen deze afwijkende borstgroei veroorzaken.